

Atak[®] 450 EC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Zawartość substancji aktywnej:

Prochloraz :N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-1H-imidazolo-1-karboksamid (związek z grupy imidazoli) **450 g w 1 litrze środka.**

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: ksylen, dimetylobenzen-mieszanina izomerów.

Zezwolenie MRiRW Nr R-45/2008 z dnia 28.05.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 294/2011d z dnia 09.11. 2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -328/2011d z dnia 20.12. 2011 r.

Produkt łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska



Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 4°C i nie wyższej niż 25°C

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia,
tel.: +353 (1) 822 45 55 fax: +353 (1) 822 46 78 e-mail: info@barclay.ie

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji- na opakowaniu

Zawartość netto- na opakowaniu

Nr partii- na opakowaniu

I OPIS DZIAŁANIA

Atak 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

UWAGA: Środek stosować w zbożach jednorazowo w okresie wegetacji.

1. Zboża ozime.

Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

- pszenica, pszenżyto.

mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy.

- jęczmień.

łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy.

- żyto.

łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna.

- Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Zboża ozime i jare.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

- pszenica, pszenżyto, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

- pszenica ozima, pszenżyto ozime.

mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

- jęczmień ozimy, jęczmień jary.

mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza.

- żyto.

mączniak prawdziwy, rynchosporioza.

- pszenica jara, pszenżyto jare.

- mączniak prawdziwy, rynchosporioza.

- Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

- rzepak ozimy.

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyń na rzepaku.

czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

- Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

zboża - 35 dni
rzepak - 45 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszałem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszało hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 4° C i nie wyższej niż 25° C.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie pokłnięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 349 28 31
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99
Lublin - (0-prefiks-81) 740 89 83
Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00
Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 40 25
Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45
Tarnów - (0-prefiks-14) 631 51 77
Warszawa - (0-prefiks-22) 619 66 54
Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08